

# HYPERTENSIE EN CONTRA-INDICATIE VOOR ACE-REMMER

## HARTFALEN

### SECUNDAIRE PREVENTIE MI

A II-antagonist ↓ A II-antagonist	equivalente dosis				dosering bij verminderde nierfunctie
<b>Valsartan</b>	1 dd 40 mg 2 dd 20 mg	1 dd 80 mg 2 dd 40 mg	1 dd 160 mg 2 dd 80 mg	1 dd 320 mg 2 dd 160 mg	geen aanpassing
<b>Losartan</b> - Hypertensie - Hartfalen - Secundaire preventie MI	1 dd 25 mg 1 dd 50 mg 1 dd 12,5-25 mg	1 dd 50 mg 1 dd 50 mg 1 dd 50 mg	1 dd 100 mg 1 dd 100 mg 1 dd 100 mg	- 1 dd 150 mg 1 dd 150 mg	geen aanpassing geen aanpassing geen aanpassing
<b>Irbesartan</b> - Hypertensie	1 dd 75 mg	1 dd 150 mg*	1 dd 300 mg	-	geen aanpassing
<b>Candesartan</b> - Hypertensie - Hartfalen	1 dd 4 mg 1 dd 4-8 mg	1 dd 8 mg 1 dd 16 mg**	1 dd 16 mg 1 dd 32 mg	1 dd 32 mg -	geen aanpassing geen aanpassing
<b>Telmisartan</b> - Hypertensie	1 dd 20 mg	1 dd 20-40 mg	1 dd 40-80 mg	1 dd 80 mg	geen aanpassing
<b>Olmesartan</b> - Hypertensie	1 dd 10 mg	1 dd 10 mg	1 dd 20 mg	1 dd 40 mg	Cl 10-30: 20 mg/dag
<b>Eprosartan</b> - Hypertensie	1 dd 400 mg	1 dd 600 mg	-	-	geen aanpassing

\* Bij ouderen irbesartan > 75 jr aanvankelijk 75 mg.

\*\* Candesartan doseren op basis van tolerantie tijdens verdubbeling van de dosis.